

ERTISSEMENTS AGRIC

REGION MIDI-PYRENEES

EDITION GRANDES CULTURES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Rue Saint-Jean . B.P. 19 . 31131 BALMA CEDEX Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33

Abonnements: 61.24.70.30

PUBLICATION PERIODIQUE

Régisseur de Recettes D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES" CCP: 8618-62 Y Toulouse I.S.S.N.: 0752-2053

ABONNEMENT ANNUEL 200 F. BULLETIN N° 11 DU 24 JUIN 1992

MAIS


Situtation

SESAMIE :

Le vol de l'insecte termine, un regroupement des sorties de papillons a été observé dans les derniers jours de mai et les premiers jours de juin. Les évolutions larvaires restent ralenties températures par les actuelles.

Les migrations de plante à plante n'ont pas encore commencé.

VOL DE LA SESAMIE cages d'élevage



Préconisation

Nº 532

DICALLU, CIPPA,P

Directour - Cirant;

Annicolet de MIDI. PYRETIEFS II

Imprimé à la Station d'Ayardisser, ants

· Parcelles ayant reçu une demi-dose d'insecticide à un stade précoce

Renouveler le traitement 3 semaines après la précédente intervention.

• Parcelles non traitées

Un intervention sera encore efficace.

Intervenir à la dose pleine à réception du bulletin.

PYRALE


Situation

Le vol de la pyrale a débuté plus précocement qu'à l'accoutumé. La maximum du vol sera atteint dans les prochains jours.

Préconisation

Dans les parcelles de mais semence et de consommation bon potentiel rendement, il est possible, cette année, de contrôler la pyrale autravers traitement contre la sésamie. Choisir unespécialité commerciale autorisée pour les deux usages.

VOL DE LA PYRALE cages d'élevage



MASSEUBE

RISCLE

MAUVEZIN

IB